



Reunión REDLA – OID-CICAD-OEA

Washington, 14 al 16 de noviembre de 2011

Caracterización del consumo de pasta base-paco. Argentina 2011

Mgter. Graciela Ahumada
Coordinadora del Área de Investigaciones
Observatorio Argentino de Drogas - SEDRONAR

Caracterización de la sustancia Pasta base/Paco


- ❑ A principios del 2000 aparecen los primeros casos de jóvenes de sectores marginales que “fumaban cocaína”
 - ❑ Composición: alcaloide de cocaína en concentraciones muy pequeñas, “estirado” con otras sustancias como cafeína y bicarbonato de sodio.
 - ❑ Uso indistinto del nombre pasta base/base/paco, consumida en pipa, cañito o cigarro.
 - ❑ Jergas entre usuarios:
 - según el consumo: Pasta base (pipa), Paco (cigarro), Mixta (porro+base)
 - según comercialización: Base cuando se compra y Paco cuando se consume. “alta”=cocaína, “baja”= Pasta base
-



Consumo reciente de Pasta base-paco


Población de 16 a 65 años. Estudios Nacionales

Prevalencia de año de sustancias ilícitas. Población de 16 a 65 años



Promedio de edad de inicio en el consumo de drogas ilícitas. Población de 16 a 65 años.

■ Varones ■ Mujeres ■ Total




	2004	2006	2008	2010	2004	2006	2008	2010	2004	2006	2008	2010	2004	2006	2008	2010
	Marihuana				Cocaína				Pasta base-paco				Extasis			
■ Varones	18,3	18,2	18,3	18,7	20,1	18,7	19,6	19,1	26,0	19,1	19,3	17,9	25,0	20,5	21,5	22,4
■ Mujeres	20,1	18,5	18,8	19,8	20,1	19,2	19,3	21,1	18,4	19,0	19,4	16,5	21,5	20,0	21,5	25,8
■ Total	18,8	18,3	18,5	19,0	20,1	18,9	19,5	19,4	24,8	19,1	19,3	17,8	24,3	20,3	21,5	23,3

Porcentaje de población que considera fácil el acceso a drogas.


Población de 16 a 65 años

■ 2006 ■ 2008 ■ 2010




Porcentaje de población que recibió oferta de drogas. Población de 16 a 65 años


■ 2006 ■ 2008 ■ 2010



Porcentaje de personas que evalúan de Gran Riesgo el consumo de sustancias. Población de 16 a 65 años.




Porcentaje de personas que evalúan de Ningún Riesgo el consumo de sustancias. Población de 16 a 65 años.




Tendencia en el consumo en adolescentes escolarizados

**Estudios Nacional en Estudiantes del Nivel Medio
2001, 2005, 2007 y 2009**


Prevalencia de año de drogas ilícitas



Prevalencia de año de pasta base



Prevalencia de consumo reciente según provincias. Estudiantes del nivel medio 2009



**Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según sexo.
Población escolar del nivel medio. Total del país. 2009**

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	VARÓN	MUJER	TOTAL
Tabaco	28,3	28,0	28,1
Alcohol	60,3	59,7	59,8
Tranquilizantes sin pm	2,1	2,0	2,1
Estimulantes sin pm	1,8	1,3	1,5
Solventes / Inhalables	2,4	1,1	1,7
Marihuana	12,0	5,3	8,4
Pasta base – Paco	1,3	0,6	0,9
Cocaína	3,6	1,2	2,3
Éxtasis	1,9	1,0	1,4
Otras drogas	2,5	1,1	1,8
Alguna droga ilícita	13,5	6,4	9,6

La tasa de incidencia anual es del 0.8% (13.500 alumnos), 1.2% en varones y 0.5% en mujeres


Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas según edad. Población escolar del nivel medio. Total del país. 2009

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	14 o menos	15 / 16	17 o más
Tabaco	16,3	32,1	39,2
Alcohol	38,7	68,5	78,9
Tranquilizantes sin pm	1,4	2,7	2,2
Estimulantes sin pm	1,0	2,0	1,5
Solventes / Inhalables	1,1	2,4	1,5
Marihuana	2,9	9,5	14,1
Pasta base – Paco	0,6	1,5	0,6
Cocaína	0,9	2,9	3,2
Éxtasis	0,8	2,0	1,4
Otras drogas	1,0	2,4	2,0
Alguna droga ilícita	3,9	11,1	15,3

La tasa de incidencia mayor esta en los alumnos de 15-16 años (1.4%=7.400 alumnos), y es de 0.5% en los otros grupos de edad.

Patrón de uso según edad y sexo. Estudiantes del nivel medio 2009.

■ Experimental ■ Ocasional ■ Frecuente




Percepción de facilidad de acceso. Población escolar del nivel medio. Total del país. 2009

¿Cuán fácil o difícil te sería conseguir?	Marihuana	Cocaína	Pasta base-paco	Éxtasis
Fácil	37,6	20,9	19,9	15,9
Difícil	8,7	16,7	13,8	14,5
No podría conseguir	12,8	16,5	19,0	19,4
No sabe / No contesta	40,9	45,9	47,3	50,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0




Porcentaje de estudiantes que tuvieron oferta de drogas ilícitas según sexo y edad. Población escolar del nivel medio. Total del país. 2009

■ Total ■ Varones ■ Mujeres




■ 14 o menos ■ 15 / 16 ■ 17 o más




Percepción de riesgo del uso de pasta base o crack. Estudiantes del nivel medio. Argentina 2009

■ Ningun riesgo ■ Gran Riesgo ■ No sabe



Factores de riesgo y protección y consumo de pasta base/paco. Estudiantes del nivel medio. Argentina 2009



Demanda de tratamiento

Estudio Nacional en Pacientes en Tratamiento 2010

Demanda de tratamiento

Estudio Nacional en pacientes en tratamiento 2010

Sustancia	Casos	%
Alcohol	4362	20.5
Solventes/inhalables	636	3.0
Cannabis	2251	10.6
Clorhidrato de cocaína	8073	38.0
Pasta base-paco	1938	9.1
Otras cocaínas	84	0.4
Drogas de síntesis	161	0.8
Combinación de sustancias	2113	9.9
Otras	1634	7.7
Total pacientes	21.252	100

El 18.4% de los pacientes alguna vez en su vida consumió PBC/paco, el 19.5% de varones y el 13.5% de las mujeres. El 23.3% de los pacientes que tienen entre 15-19 años, el 31.3% de 20-24 años, el 23.1% de 25 a 29 años y el 19.2% de 30 a 34 años, el 5.1% de 35 a 39 años y el 3.3 % de los de 40 años y mas.




Perfil sociodemográfico de los pacientes por PBC/Paco. Argentina 2010.

- ▶ El 89.9% varones y el 10.2% mujeres
- ▶ El 56.7% tiene hasta 24 años, el 14.5% entre 25 y 29; el 5.8% entre 35 a 39 y el 23.2% entre 40 y más.
- ▶ El 21.3% estaba ocupado, el 72.2% inactivo y el 6.6% desocupado.
- ▶ El 79.8% secundario incompleto y el 20.2% secundario completo.




Pacientes en tratamiento por consumo de PBC/paco. Argentina 2010

Drogas de inicio



Cantidad de drogas consumidas en la vida



Perfil de consumo

- ▶ El 46.8% de los pacientes en tratamiento presentan policonsumo. De éstos, el 13% mencionó a la PBC/Paco como la droga de mayor consumo.
- ▶ Del total de pacientes, el 10% reconoce a PBC-Paco como la droga de mayor daño
- ▶ El 29.1% de los pacientes que buscaron tratamiento por PBC-paco lo hicieron por problemas familiares, el 18.7% por malestares físicos, el 17.8% por problemas emocionales, el 8.9% por problemas judiciales.
- ▶ El 92% de estos pacientes tuvo un tratamiento previo por la misma sustancia.



Ventanas epidemiológicas en Centros de Atención Primaria de la Salud

Año 2011

Ciudad de La Rioja (181.000 habitantes)

Provincia de La Rioja. 13 CAPs, 995 encuestas en total.

Ítem	Valor mínimo	Valor máximo
Prevalencia vida de los encuestados	0.0-1%	2%
% de familiares que consumen	0.0 -1.1	6.5
% de conocidos en el barrio que consumen	0.0-2.6	41.2
% Facilidad de acceso	5.6	38.3
% Dificultad de acceso	1.9	16.4
Oferta de pasta base	5% del total 17.6 % de los que recibieron oferta	



Ciudad de Rawson (131.313 habitantes)

Provincia de Chubut. 3 CAPs, 301 encuestas en total.

Ítem	Valor mínimo	Valor máximo
Prevalencia vida de los encuestados	0.0	3%
Prevalencia de año de los encuestados	0.0	1%
% de familiares que consumen	0.0	1
% de conocidos en el barrio que consumen	1	12
% Facilidad de acceso	3.1	5.1
% Dificultad de acceso	8.9	13.5
Oferta de pasta base	3.3% del total 7.6 % de los que recibieron oferta	



Ciudad de Salta (536.113 habitantes)

Provincia de Salta. 6 CAPs, 437 encuestas en total.

Ítem	Valor mínimo	Valor máximo
Prevalencia vida de los encuestados	0.0-1.6%	11.5%
Prevalencia de año de los encuestados	0.0 -1.2%	7.1%
Prevalencia de mes de los encuestados	0.0-1.2%	5.9%
% de familiares que consumen	3.8	22.4
% de conocidos en el barrio que consumen	41.3	63.5
% Facilidad de acceso	33.8	64.2
% Dificultad de acceso	1.9	11.1
Oferta de pasta base	19.5% del total 58.2 % de los que recibieron oferta	

GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

Graciela Ahumada

www.observatorio.gob.ar

